

피부발진, 피부암, 부종 자가관리

03 의료진에게 알려야 하는 경우

증상 악화

- 처방받은 약으로 증상이 호전되지 않는 경우
- 피부염이 심해 견디기 힘든 경우
- 오랜 시간 피부발진이 지속되는 경우
- 손과 발, 눈 등에 붓기(부종)가 심한 경우

MEMO

항암화학요법 자가관리 피부발진, 피부암, 부종

ASAN MEDICAL CENTER
PATIENT FAMILY EDUCATION GUIDE

서울아산병원 | 암병원 | 암교육정보센터



서울아산병원 암교육정보센터

서울특별시 송파구 올림픽로 43길 88 (05505)
대표전화 : 1688-7575
홈페이지 : www.cancer.amc.seoul.kr

피부발진, 피부암, 부종 자가관리

01 증상은 왜 나타나나요?

피부발진 및 피부암



항암치료를 받는 동안 일시적으로 피부에 울퉁불퉁하고 붉은 발진이 나타날 수 있습니다. 발진은 개인마다 차이가 있을 수 있습니다. 만약 심각한 피부발진을 경험한다면 의료진은 항암치료를 중단하고 피부발진이 회복된 후 용량을 줄여 투약하거나, 다른 약으로 변경할 수 있습니다.

그러나 임의로 약 복용을 중단하거나 용량을 줄여서는 절대 안됩니다. 피부 손상 정도가 심하지 않다면 치료는 계획대로 진행합니다.

넥사바, 젤보라프, 라핀나 등의 항암제를 사용하는 경우, 피부에 사마귀 모양의 발진이 생길 수 있습니다. 오랜 시간 지속되는 피부발진이 있는 경우 피부과 검진 및 조직검사 등을 받아야 하며 피부암으로 진단될 경우 완전히 절제하는 치료를 받아야 합니다. 그러나 피부암이 발생한다고 해서 항암치료 약제의 용량을 줄이거나 중단할 필요는 없습니다.

부종

눈 주위가 붓거나 중력에 의해 영향을 받는 신체 부위가 붓는 증상이 발생합니다.

QR 코드를 스캔하시면, 관련 교육자료를 볼 수 있습니다

항암화학요법
자가관리



피부 관리
애니메이션



피부발진, 피부암, 부종 자가관리

02 대처 방안

피부발진 및 피부암

01

평소 피부를 청결하게 유지합니다. 피부가 민감한 경우 비누를 사용하지 않거나 순한 비누를 사용합니다.

02

보습효과가 좋은 로션이나 크림을 사용합니다. 향수나 향기가 나는 로션은 사용하지 않습니다.

03

면 종류의 혈령한 옷을 입고 지나치게 꽉 끼는 옷은 피하도록 합니다. 피부에 밴드, 파스와 같은 접착력이 있는 제품을 사용하지 않습니다.

04

피부발진이 생긴다고 항암제 복용을 임의로 중단해서는 안됩니다.

05

처방받은 약과 연고만 사용합니다.

06

가려움이 있는 경우 냉찜질 등으로 증상을 완화시킬 수 있습니다. 이차 감염과 피부 손상을 예방하기 위해 긁거나 문지르지 않습니다.

07

외출 시 자외선 차단제(SPF 30 이상)을 바릅니다.

08

피부발진이 계속되는 경우 피부과 검진 및 조직검사 등을 받도록 합니다.

부종

01

심하지 않은 경우 치료가 필요하지 않지만 범위가 넓고 심한 경우 저염식을 하면서 이뇨제를 사용합니다

02

눈 주위가 붓는 증상이 나타나면 안약을 사용해볼 수 있습니다.